

ARMERIL 10 GR

ACCIÓN FITOSANITARIA: Insecticida

INGREDIENTE ACTIVO: Oxamil

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Granulado

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: ARMERIL 10 GR es un insecticida sistémico aplicado al suelo, no volátil. Pertenecer al grupo de los carbamatos. Actúa en el insecto por contacto e ingestión, bloqueando el normal funcionamiento de la colinesterasa.

FITOTOXICIDAD: No es fototóxico si se aplica directamente siguiendo las instrucciones de este panfleto.

COMPATIBILIDAD: No debe mezclarse con productos de reacción alcalina.

FORMA DE EMPLEO O APLICACIÓN

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Asegúrese que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Se puede utilizar la bomba manual para aplicación de granulados. Este producto no tiene acción corrosiva sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Este producto viene listo para su uso y no necesita ninguna preparación previa para ser aplicado a los cultivos que protege.



RECOMENDACIONES DE USO: Guatemala

Cultivo	Plaga	Dosis
Banano <i>Musa spp</i>	Picudo negro (<i>Cosmopolites sordidus</i>)	25-30 g/planta

PICTOGRAMAS



PRECAUCIONES

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto en lugares frescos, secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, es corrosivo.

INTERVALO DE APLICACIÓN: se aplica una sola vez.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA: Realizar una aplicación a los 70 días después de la siembra en forma de media luna en la base de la planta.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se debe esperar 24 horas antes de ingresar al área tratada o utilizar el equipo de protección personal completo.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: dolor de cabeza náuseas, calambres, taquicardia, hipotermia. Puede causar convulsiones, vomito, temblores, dilatación de pupilas y coma, obstrucción de las vías respiratorias o aumento de las secreciones mucosas en los pulmones, irritación de ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

TRATAMIENTO MÉDICO: Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

PICTOGRAMAS



